

INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES PENDIENTES DE REALIZAR PRUEBAS CUTÁNEAS EN PRICK Y PRICK-PRICK CON ALIMENTOS

Las **pruebas cutáneas de alergia** o **prick test** son unas pruebas que se realizan sobre la piel, con el fin de identificar la sustancia que puede desencadenar una reacción alérgica en el paciente. Para ello, se le introduce en la piel una cantidad ínfima del posible agente causante de la alergia. A esta sustancia que desencadena una alergia la llamamos alérgeno. Si el paciente está tomando algunos medicamentos, esas pruebas serán negativas y tendremos “falsos negativos”; por este motivo, usamos controles (suero salino e histamina), para saber si le podemos hacer las pruebas.

EL PACIENTE QUE VAYA A REALIZAR LA PRUEBA NO PODRÁ TOMAR LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS:

- **ANTIISTAMÍNICOS** (Ebastel®, Polaramine®, Atarax®, Zyrtec®, Clarityne®, Alerlisin®, Optimin®, Triludan®, Mizolen®, Zolistran®, Civeran®, Virlix®, Velodan®, Mircol®, Telfast®, Rinoebastel®, Narine®, Aerius®, Xazal®, Loratadina®, Cetiricina®, Rupatadina®, Rupafin®, Azomyr®, Obalix®, Bilaxten®, etc.) en los **ÚLTIMOS SIETE DÍAS**.
- **ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS** (Tryptizol®, etc.).
- Medicamentos **PARA EL CATARRO** (Frenadol®, Desenfriol®, Couldina®, Rinoefrenal®, etc.).
- Medicamentos **PARA EL MAREO**.
- **CORTICOIDES TÓPICOS EN LA ZONA DE REALIZACIÓN** de las PRUEBAS (cara anterior del antebrazo en el prick).
- **ZASTEN®** (es un antihistamínico) hay que suspenderlo 15 días antes.

PARA HACER PRUEBAS CUTÁNEAS CON ALIMENTOS EN **PRICK-PRICK**:

- **Si se trata de alimentos que se cocinan, como el marisco, pescados, etc.**, traerá dos piezas o dos trozos, uno CRUDO y otro COCIDO. Ejemplo: gamba o langostino, trozo de nécora, etc.
TIENEN QUE SER **COCIDOS POR SEPARADO Y SE TRAERÁN EN RECIPIENTES SEPARADOS**.
- **SI SE TRATA DE FRUTAS, SE TRAE UN TROZO o UNA PIEZA TAL CUAL**.
- **Si son legumbres, verduras, etc.**, se traerá un trozo, pieza o pequeña cantidad cruda (en el caso de lenteja, garbanzo, etc., se debe dejar en agua desde el día anterior) y otra parte cocida. Ejemplo: lentejas, una pequeña cantidad cruda y la otra cocida.
TIENEN QUE SER **COCIDOS POR SEPARADO Y SE TRAERÁN EN RECIPIENTES SEPARADOS**.

Para la realización del *prick-prick* necesitamos una pequeña cantidad del alimento, no mayor que el tamaño de una nuez.